

Esami colturali in genere

Tampone Faringeo, Oculare, Auricolare, Cutaneo, ecc

Si raccomanda di non essere in terapia antibiotica o di averla sospesa da almeno 4-5 giorni prima del prelievo.

Per il Tampone Faringeo si consiglia il digiuno in quanto il prelievo stimola i riflessi del vomito; non si devono eseguire gargarismi o sciacqui del cavo orale con colluttori e dentifrici; non si deve fumare nel periodo immediatamente precedente l'esecuzione dell'esame.

Tampone colturale uretrale

L'area periuretrale deve essere pulita accuratamente e il paziente non deve aver urinato da almeno 2 ore prima dell'esecuzione dell'esame.

Il prelievo viene eseguito in ambulatorio da personale medico. La raccolta del campione è ottenuta introducendo in uretra un piccolo tampone urogenitale sterile, lasciandolo inserito per alcuni secondi per saturare le fibre con l'essudato.

Il paziente deve astenersi da rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l'esame. Si raccomanda di non essere in terapia antibiotica.

Tampone vaginale colturale Esame a fresco del Fluor Vaginale

La paziente non deve essere in periodo mestruale, non deve aver urinato nelle ultime 3 ore e non deve eseguire lavande vaginali prima del prelievo. Inoltre deve astenersi da rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l'esame.

Qualora sia richiesta la ricerca di Chlamydia e Micoplasmii il prelievo viene eseguito su appuntamento, da personale medico specialista. La raccolta del campione è ottenuta con l'aiuto di uno speculum. Dopo aver rimosso il tappo mucoso cervicale con un batuffolo di cotone, si introduce un tampone sterile nel canale cervicale e con movimento rotatorio si raccoglie sia l'essudato che le cellule cervicali.

Test di Stamey o Prova dei 3 Bicchieri

L'area periuretrale deve essere pulita accuratamente e il paziente non deve aver urinato prima dell'esecuzione dell'esame.

1. Il paziente deve urinare i primi 20 - 30 ml in un vasetto sterile.
2. Continuare la raccolta di altri 20 - 30 ml in un secondo vasetto sterile.
3. A questo punto viene eseguito il massaggio prostatico.
4. Infine il paziente raccoglie ulteriore urina in un terzo vasetto.